

Objectifs du soin de prothèse

- > **Favoriser** une bouche propre et saine en éliminant les débris alimentaires et la plaque dentaire
- > **Participer** à la prévention des troubles bucco-dentaires et leurs conséquences ainsi que des complications fonctionnelles
- > **Contribuer** à la qualité de vie et de relation sociale et familiale du résident



Recommandations

Une démarche interne à l'établissement permet d'anticiper les besoins bucco-dentaires de chaque résident (*recueil des coordonnées du chirurgien dentiste référent dès l'admission, date de la dernière consultation dentaire...*)

Une consultation dentaire annuelle est préconisée afin de réajuster la prothèse si besoin, et réaliser un nettoyage minutieux,

Antenne Régionale d'Alsace de Lutte contre les Infections Nosocomiales

CHU Hôpital civil
23, rue de la porte de l'hôpital - BP 426
67091 Strasbourg Cedex
03.88.11.54.32 / arlin-alsace@chru-strasbourg.fr

Antenne Régionale de Bourgogne

CHU Hôpital François Mitterrand
14, rue Paul Graffarel
21079 Dijon Cedex
03.80.29.33.94 / secretariat.arlinbourgogne@chu-dijon.fr

Antenne Régionale de Champagne-Ardenne

CHU-Clinique de Champagne
3, rue de l'Université
51100 Reims
03.26.78.94.91 / arlinca@chu-reims.fr

Antenne Régionale de Franche Comté

2 place Saint Jacques
25000 Besançon
03.81.21.89.30 / rfclin@chu-besancon.fr

Antenne Régionale de Lorraine

Hôpitaux de Brabois
Rue du Morvan
54511 Vandœuvre-lès-Nancy
03.83.15.74.58 / arlin@chru-nancy.fr

Cclin Est

Hôpitaux de Brabois
Rue du Morvan
54511 Vandœuvre-lès-Nancy
03.83.15.34.73

cclin.est@chru-nancy.fr
www.cclin-est.fr

L'entretien des
prothèses dentaires
en établissement
de santé



Centre de Coordination de Lutte contre
les Infections Nosocomiales du Grand Est

L'hygiène quotidienne des prothèses dentaires est primordiale afin de prévenir d'éventuelles infections.

Une prothèse dentaire est constituée de résine dentaire, qui à l'échelle microscopique, présente une porosité favorable au développement de micro-organismes

Matériel



- ◆ Gants de soins en vinyle à usage unique
- ◆ Solution Hydro-Alcoolique (SHA)

Entretien des prothèses et soin de bouche

- ◆ Brosse à dentier ou à dents à poils souples
- ◆ Boîte à prothèses
- ◆ Savon doux liquide car certains dentifrices sont trop abrasifs
- ◆ Nettoyant pour prothèse (type comprimé effervescent ou poudre) si trempage
- ◆ Solution pour soins de bouche
- ◆ Compresse non stériles

Conseil

Nettoyer la prothèse au dessus d'un récipient ou lavabo rempli d'eau afin d'éviter de fracturer la prothèse en cas de chute

Soins de la prothèse



A réaliser après chaque repas, ou au minimum une fois par jour

1. Réaliser une hygiène des mains avec une SHA
2. Enfiler les gants à usage unique
3. Eliminer les résidus d'adhésifs éventuels à l'aide d'une compresse
4. Brosser toutes les faces de la prothèse avec le savon doux ou le dentifrice, sans oublier les espaces inter-dentaires et les parties reposant sur la gencive
5. Rincer à l'eau tiède du réseau
6. Contrôler la prothèse



L'entretien de la prothèse est à compléter avec un soin de bouche comprenant également un nettoyage des gencives

Selon le cas

> La replacer en bouche, si besoin, avec une petite quantité de crème adhésive

OU

> La conserver dans sa boîte non fermée et sans liquide après séchage minutieux à l'aide d'une compresse

Attention

Une immersion dans une solution de nettoyage n'est pas suffisante pour éliminer les dépôts

Un trempage de prothèse ne doit jamais durer toute la nuit, mais être compris entre 15 et 20 min au maximum

N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer la prothèse

Quand faire tremper la prothèse ?



En présence de petit débris

- ◆ Rincer sans délai la prothèse sous l'eau tiède du réseau
- ◆ Puis, la tremper dans une boîte individuelle pour prothèses avec une solution diluée (eau et comprimé effervescent ou poudre) en respectant le temps préconiser par le fabricant (15-20 min maximum)

Si présence de tartre ou de débris plus rebelles, utiliser la même méthode.

> 2 à 3 trempages successifs peuvent être nécessaires



En cas de prothèse très entartrée, une visite chez le dentiste est recommandée afin de procéder à un nettoyage complet par ultrasons



Remarque

La Haute Autorité de Santé recommande de faire tremper tout type de prothèse, une fois par semaine pendant 15 min, dans une solution antiseptique adaptée

Sources :

RFCLIN PRIMAIR, L'hygiène bucco-dento-prothétique dans les établissements de santé et médico-sociaux
CClin, Arlin, fiche techniques / pratiques : soins d'hygiène bucco-dentaire