

Le port du masque

Le bon port du masque est primordial. Mal positionné il est inefficace !

- La barrette nasale doit toujours être positionnée vers l'extérieur
- Le masque doit couvrir le nez et la bouche
- Il ne doit pas être repositionné ou porté en collier
- Il est à changer toutes les 3 heures
- Une friction hydro-alcoolique est requise avant la mise en place du masque et après son retrait

La vaccination

La vaccination reste le meilleur moyen de prévention.


Elle s'effectue lors de la même injection que le DT-coq-polio et doit être réalisée à 2, 4 et 11 mois.

Les rappels suivants auront lieu à l'âge de 6, 11, et 25 ans.

Il est recommandé pour l'entourage proche du nouveau-né (cocooning et professionnels) d'effectuer un rappel à 45 et 65 ans puis tous les 10 ans.

<https://www.mesvaccins.net/>

<http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal>



A chaque région son antenne

Antenne Régionale d'Alsace de Lutte contre les Infections Nosocomiales

CHU Hôpital civil
23, rue de la porte de l'hôpital - BP 426
67091 Strasbourg Cedex
03.88.11.54.32 / arlin-alsace@chru-strasbourg.fr

Antenne Régionale de Bourgogne

CHU Hôpital François Mitterand
14, rue Paul Graffarel
21079 Dijon Cedex
03.80.29.33.94 / secretariat.arlinbourgogne@chu-dijon.fr

Antenne Régionale de Champagne-Ardenne

CHU-Clinique de Champagne
3, rue de l'Université
51100 Reims
03.26.78.94.91 / arlinca@chu-reims.fr

Antenne Régionale de Franche Comté

2 place Saint Jacques
25000 Besançon
03.81.21.89.30 / rfclin@chu-besançon.fr

Antenne Régionale de Lorraine

Hôpitaux de Brabois
Rue du Morvan
54511 Vandoeuvre-lès-Nancy
03.83.15.74.58 / arlin@chru-nancy.fr

CCLin Est

Hôpitaux de Brabois
Rue du Morvan
54511 Vandoeuvre-lès-Nancy

03.83.15.34.73
cclin.est@chru-nancy.fr
www.cclin-est.fr



La coqueluche

Prévenir la coqueluche en milieu médico-social

Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales du Grand Est

Décembre 2016

Qu'est ce que la coqueluche ?

C'est une infection respiratoire d'origine bactérienne causée par *Bordetella pertussis*, d'évolution longue (jusqu'à 100 jours) et hautement contagieuse.

Transmission

La coqueluche est transmise par les gouttelettes émises lors de la toux, les éternuements et la parole.

Contagiosité

Les sujets malades sont contagieux dès l'apparition des premiers symptômes, et ce, pendant 5 jours après le début du traitement antibiotique ou 3 semaines en l'absence de traitement.



Signes et symptômes

- Toux +++
 - Evolution en toux quinteuse (toux sèche)
 - le plus souvent nocturne et insomniante
 - parfois accompagnée de vomissements
 - congestion du visage avec possible cyanose
 - reprise respiratoire difficile avec un son souvent comparé au « chant du coq »
- Attention le « chant du coq » peut être absent chez le nourrisson ou le sujet anciennement vacciné*
- Absence de fièvre ou fièvre modérée

Prévenir les nouveaux cas

Du côté des soignants

- Installer le patient en chambre seule ou regrouper les cas
- Porter un masque chirurgical de type IIR dès l'entrée en chambre et le retirer à la sortie
- Aérer la chambre quotidiennement
- Observer une hygiène des mains après contact avec le patient ou son environnement

Du coté des patients

- Suspendre les activités communes durant la période de contagiosité
- Prise des repas en chambre
- En cas de sortie de chambre le patient doit porter un masque chirurgical et réaliser une friction hydro-alcoolique

Du coté des visiteurs

- Limiter les visites
- Eviter la présence d'enfants et de personnes à risques
- Ne pas s'asseoir sur le lit et éviter les contacts rapprochés avec le patient
- Porter un masque chirurgical de type IIR dès l'entrée en chambre et le retirer à la sortie
- Réaliser une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique à la sortie de chambre

Personnes exposées

Contacts proches

- Personnes vivants sous le même toit
- « Flirt »
- Personnel de crèche et halte-garderie

Contact occasionnels

Comprend toute personne ayant eu un contact face à face à moins d'un mètre de distance pendant plus d'une heure .

- Amis
- Milieu scolaire
- Milieu professionnel
- Etablissement de santé

Lors d'un diagnostic de coqueluche

- Identification des personnes exposées (patients, résidents, personnel, visiteurs,...)
- Antibioprophylaxie des contact proches
 - Si non vaccination ou vaccination incomplète
 - Si vaccination datant de plus de 5 ans
 - Si sujet à risque (nourrisson non vacciné, femme enceinte, personne atteinte de pathologies respiratoires chroniques, personne immunodéprimée, personne au contact de sujets à risques,...)
- Antibioprophylaxie des contacts occasionnels s'ils sont des sujet à risque
- **Surveillance active des nouveaux cas durant 3 semaines après la survenu du cas index**
- Déclaration à l'Agence Régionale de Santé (ARS) et au réseau Cclin/Artlin